

Увеличения степени сексуального удовлетворения

Об этом не говорят вслух Это не хочется обсуждать даже с близкими людьми.... Об интимной жизни сложно говорить, еще сложнее обсуждать проблемы интимного характера, связанные и с отсутствием утраченного удовольствия во время половых актов и интимными недостатками...

Боитесь операции? У нас есть решение – решение без хирургического вмешательства.

Сегодня ЦРТ АИСТ предлагает этот совершенно новый для Томска и уже востребованный способ увеличения степени сексуального удовлетворения для большинства женщин.



Акцентирование точки G

Большее акцентирование точки G посредством увеличения ее объема сделает ее более доступной для стимуляции пальцем или половым членом, таким образом, половые акты будут приносить большее удовольствие.

Важно помнить, что стараясь достичь оргазма, необходимо экспериментировать, стремиться к новым ощущениям, которые доставляют вам удовольствие, познавать себя, учиться заниматься любовью с самой собой, чтобы лучше делать это со своим партнером. Заниматься любовью – означает доставлять удовольствие не только самой себе или только партнеру, удовольствие нужно испытывать вместе. Никакое медицинское вмешательство не сможет заменить общение и взаимопонимание между двумя людьми.

Имплантация гиалуроновой кислоты BELLCONTOUR® GVISС – это безоперационный метод интимной пластики, позволяющий наилучшим образом выделить точку G

Если вы решились на инъекцию гиалуроновой кислоты BELLCONTOUR® GVISС в точку G, то обязательно проконсультируйтесь с врачом-гинекологом ЦРТ АИСТ. Он

спланирует осуществление простой и быстрой процедуры, занимающей всего несколько минут, которая поможет вам получать максимальное удовольствие во время половых актов.

О методике акцентирования точки G

Только у наших специалистов, здесь, в клинике АИСТ, вы можете узнать, прочитать, спросить всё о безоперационном методе коррекции новым препаратом GV1SC из серии швейцарских филлеров BELLCONTOUR. Только здесь Вам помогут вернуться к полноценной и гармоничной интимной жизни.

GV1SC у женщин применяется в разных целях:

- для увеличения точки G,
- восстановления объема половых губ,
- а также коррекции возрастных изменений и половых расстройств у мужчин и женщин.

Акцентирование точки G посредством увеличения ее объема, делает ее более доступной для стимуляции, что способствует улучшению нормальной сексуальной функции и увеличению сексуального удовлетворения.

Кому это нужно:

- Женщинам со сниженным либидо.
- Женщинам, не получающим или утратившим по каким-либо причинам способность получать вагинальный оргазм.
- Женщинам с возрастными инволюционными изменениями половых губ, стенок влагалища.

Точка G

- Увеличение объема точки G позволяет ей быть более доступной для стимуляции.
- Повышение активности желез, увлажнение.
- Стимуляция точки G независимо от угла проникновения пениса.

Большие и малые половые губы

- Увеличение объема.
- Коррекция формы.
- Восстановление потерянного объема.
- Увлажнение, повышение тонуса.

Возрастные и послеродовые инволюционные изменения

- Уменьшение объема влагалища.
- Увлажнение, повышение тонуса.

Описание методики

Принцип имплантации заключается в акцентировании (увеличение объема) эрогенной зоны – точки G, чтобы сделать ее более доступной во время полового акта, и тем самым способствовать достижению вагинального оргазма, который до настоящего момента наступал редко или вообще женщиной не достигался, либо увеличить частоту и силу его интенсивности.

Для этого врач-гинеколог, под местной анестезией (безболезненно), вводит инъекцию BELLCONTOUR® GVISС внутрь влагалища с целью увеличения объема точки G.

Процедура введения препарата совершенно безболезненна и безопасна, и занимает всего несколько минут.

После процедуры необходимо избегать любых половых контактов в течение 48 часов.

Почему гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота является незаменимым тканевым компонентом человека. Она связывает воду и образует гидратированные полимеры высокой плотности, которые заполняют внутриклеточные пространства. С возрастом количество гиалуроновой кислоты в тканях прогрессивно уменьшается, что приводит к процессам дегидратации и сморщивания. Это вещество хорошо знакомо врачам и фармацевтическим лабораториям, специализирующимся на ее производстве. Более тридцати лет она широко используется в разных областях медицины, таких как офтальмология, ревматология, урология, эстетическая медицина и др.

Таким образом, используемый препарат имеет с высокую степень переносимости и рассасывается полностью через 3-12 месяцев (в зависимости от индивидуальных особенностей пациенток).

- Нет антигенных свойств
- Нетоксична
- Апирогенна
- Не мигрирует
- Не вызывает воспалений
- Стабильна
- Проста в применении
- Биосовместима
- Медленно абсорбируется

С 2005 года не зафиксировано ни одного случая развития аллергических реакции после введения (по данным статистики компании Hyal Intertrade S.A., Швейцария).

Эффективность гиалуроновой кислоты

По статистике у 25 опрошенных (из 30-ти исследуемых) женщин, спустя 6 месяцев

после введения препарата, были получены следующие результаты.

Основные положительные эффекты:

- Достижение вагинального оргазма всеми пациентками.
- Женщины, не испытывавшие ранее оргазм, получили первый вагинальный оргазм.
- Женщины, испытывавшие ранее оргазм, получают дополнительные ощущения.
- Женщины испытывают оргазм чаще и сильнее по интенсивности.
- Отдаленные эффекты.
- Усиление либидо.
- Увеличение количества половых актов.
- Повышения уровня самооценки.
- Психологический комфорт.
- Улучшение степени увлажнения слизистой половых органов у женщин.
- Повышение тонуса мышц тазовой области.
- Коррекция состояния недержания мочи.

Противопоказания:

- Аутоимунные заболевания.
- Беременность и кормление грудью.
- Склонность к развитию гипертрофических рубцов.
- Острые воспалительные процессы в местах предполагаемых инъекций.
- Наличие перманентных филлеров.

Инъекции геля Bellcontour® GVISC в точку G специалистами ЦРТ АИСТ позволят женщине обратить внимание на данную эрогенную зону и лучше почувствовать ее посредством увеличения объема.

После полного рассасывания препарата, если женщина пожелает, инъекцию можно повторять столько раз, сколько необходимо, без какого-либо дополнительного риска.

Долгосрочной целью терапии является воспроизведение вагинального оргазма самостоятельно, даже после полного рассасывания препарата.

Не ждите! Приходите! Не отказывайте себе в удовольствии!

Информация носит ознакомительный характер.

Подробная консультация у специалиста или по телефону +7 (3822) 32-09-09

Точка G - миф или реальность

Несмотря на то, что потребовалось много времени для того, чтобы обнаружить и признать существование точки G, ее описание немецким гинекологом Эрнстом фон Графенбергом в 1940 году изменило распространенную в те времена теорию, которая

существует и по сей день, о том, что у женщин есть только одна эрогенная зона, чувствительная к стимуляциям – клитор.

- Сексуальные отношения и оргазм касаются и интересуют всех людей и являются предметом жарких дискуссий.
- Женский оргазм, более или менее сложностижимый, разделяется на два типа: клиторальный и вагинальный.
- Наиболее известный и легкодостижимый оргазм клиторальный (связанный со стимуляцией клитора).
- Наименее известный и наиболее интенсивный – оргазм вагинальный (связанный со стимуляцией точки G, т.е. в процессе полового акта).
- Вопреки мнению многих, точка G есть у всех женщин и расположена она у всех приблизительно в одном и том же месте!

Таким образом, проблема заключается в незнании данной эрогенной зоны.

Хотя многие женщины не догадываются или сомневаются в реальном существовании у них точки G, они легко отличат клиторальный оргазм от вагинального. Эти женщины не знают, что во время полового акта именно благодаря трению в области точки G, расположенной в 3 – 6 сантиметрах от входа во влагалище, они ощущают наиболее сильную стимуляцию, доставляющую наибольшее удовольствие, которая вызывает вагинальный оргазм. И что именно точка G помогает им достичь вагинального оргазма!

Однако, стимуляция точки G не постоянна, она зависит от анатомических особенностей обоих партнеров, а также от выбранной сексуальной позы.

В глубине влагалища нет никаких эрогенных зон, стимуляция которых половым членом или его головкой могла бы вызвать вагинальный оргазм. В действительности, если абстрагироваться от удовольствия, вызываемого «доми-нированием» мужчины, невозможно достичь оргазма благодаря более глубокому проникновению полового члена. Очень часто глубокое проникновение полового члена во влагалище может даже быть болезненным.

Несколько уточнений по поводу точки G

- Время от времени, даже не догадываясь об этом, некоторые женщины испытывают вагинальный оргазм благодаря стимуляции точки G. При этом они все, или почти все, знают о клиторальном оргазме, наиболее легко достижимом, который можно испытать даже посредством мастурбации.
- Точка G представляет собой зону эректильной ткани, т.е. набухающей под воздействием сексуальной стимуляции. Диаметр данной зоны варьируется от 0,75 до 3 см. Она расположена на передней стенке вагинального канала на расстоянии 3-6 см от входа в него или, проще говоря, внутри влагалища за лобковой костью, обладает зернистой структурой, ощутимой при прикосновении.
- Точка G, как эректильная зона, при стимуляции пальцем или половым членом

может увеличиться от размера десятикопеечной монеты до размера монеты достоинством в пять рублей.

- Размер и чувствительность этой зоны у женщин сильно различаются, но равно как и в случае с грудью и сосками, размер не пропорционален чувствительности. Добиться стимуляции точки G легче с помощью пальцев, нежели с помощью полового члена.
- Сексуальное возбуждение, несравнимо более сильное, возникает через несколько минут стимуляции пальцами, нежели чем при стимуляции клитора, зачастую вагинальному оргазму предшествует сильный позыв к мочеиспусканию.

Женщины могут испытывать некоторые трудности с достижением вагинального оргазма при мастурбации, однако в сидячем положении или на корточках можно нащупать зону точки G при помощи среднего пальца. Некоторые женщины предпочитают внешнюю стимуляцию путем круговых движений в области живота в направлении лобка. Также эффективными могут быть круговые движения в области отверстия мочеиспускательного канала, которое увеличивается и еще больше раскрывается.

Такой вид мастурбации, известный уже довольно давно, гораздо легче понять в настоящее время на основании последних данных об анатомическом строении и данных гистологических исследований.

Несмотря на все рекомендации, даваемые обоим половым партнерам относительно точки G, некоторые женщины не могут испытать оргазм от стимуляции данной эрогенной зоны, а другие испытывают его реже или совсем перестают испытывать.

Это явление в основном связано с расположением точки G. Когда зона расположения во влагалище имеет «вогнутую» форму, то во время полового акта она редко контактирует с половым членом, и только в некоторых позах.

Кроме того, эта проблема также может быть обусловлена анатомическими особенностями влагалища некоторых женщин, причиной которых является наследственность или неоднократные роды.

Не ждите! Приходите! Не отказывайте себе в удовольствии!

Информация носит ознакомительный характер.

*Подробная консультация у специалиста или по телефону **+7 (3822) 32-09-09***